今村総合病院レジメン一覧

現在、化学療法運営委員会で承認されたレジメンの中で、ガイドラインや添付文書にて適応のあるレジメンの一覧です。

臨床試験・医師主導治験等で使用されているレジメン、適応外使用されるレジメンにつきましては表示しておりません。

当院採用薬の商品名で表記しているものもあります。ご注意ください。

赤字表記は追加したレジメンです。

なにか、ご質問等ございましたら薬剤部（内線：2404または2405）へご連絡頂きますようお願い致します。

2025年6月改定

登録疾患名	レジメ名	抗がん薬名（※は非抗がん薬）	用法・用量	投与時間	スケジュール	1コースの周期	前処置等
ATG療法	ATG療法	サイモグロブリン	2.5mg/kg	6hr	d1-5(※初日は試験投与)		コロナール400mg ボラミン
ATG療法	ATG療法（急性GVHD）	サイモグロブリン	1mg/kg	12hr	d1(※初日は試験投与)	7d	コロナール400mg ボラミン
ATG療法	hATG療法（AA）	アトガム	0.02mL/body 0.01mL/body 40mg/kg	ブリックテスト 皮内テスト 12hr	d1 d1 d1-4		ハイドロコルチゾン ボラミン注
GVHD予防	GVHD予防 Mini-メソトレキセート	メソトレキセート	5mg/body	iv	d1,3,6		
GVHD予防	GVHD予防 メソトレキセート	メソトレキセート	15mg/m2 10mg/m2	iv iv	d1 d3,6,11		
GVHD予防	GVHD予防 haplo-PTCY	エンドキサン ※ウロミテキサン ※ミコフェノール酸モフェチル	50mg/kg 20mg/kg q8hr, 15mg/kg 分2	3hr 30min p.o.	d3-4 d3-4 d5-30		アプレピタント グラニセトロン
ハーベストレジメ	ペプシド療法（ハーベスト）	ペプシド	500mg/m2（300mg/本と 残りに分けて調剤）	2hr	d1-3		グラニセトロン
ハーベストレジメ	エンドキサンハーベスト	エンドキサン ※ウロミテキサン	2000mg/m2 800mg/m2 q8hr	3hr iv	d1-2 d1-2		グラニセトロン
ホジキンリンパ腫	ABVd療法	エクザール ドキソルピシン プレオ ダカルバジン ブレドニゾロン	6mg/m2(max10mg/day) 25mg/m2 9mg/m2(max 15mg/day) 250mg/m2 60mg/body	全開 30min 1hr 3hr 30min	d1 d1 d1 d1 d1	2W	アプレピタント グラニセトロン
ホジキンリンパ腫	オブジーボ	オブジーボ	240mg/body 480mg/body	30min 30min	d1 d1	2W 4W	コロナール400mg ボラミン
ホジキンリンパ腫	キイトルーダ(古典的HL)	アドセトリス	200mg/body	30min	d1	3W	コロナール400mg ボラミン
ホジキンリンパ腫	アドセトリス	アドセトリス	1.8mg/kg	30min	d1	3W	コロナール400mg ボラミン
ホジキンリンパ腫	アドセトリス+Avd療法	アドセトリス エクザール ドキソルピシン ダカルバジン ブレドニゾロン	1.2mg/kg 6mg/m2(max10mg/day) 25mg/m2 250mg/m2 60mg/body	30min 全開 30min 3hr 30min	d1 d1 d1 d1 d1	2W	コロナール400mg ボラミン グラニセトロン
移植前処置	移植前処置 CY	エンドキサン ※ウロミテキサン	60mg/kg 24mg/kg q8hr	3hr iv	d1-2 d1-2		グラニセトロン
移植前処置	移植前処置 Flu25	フルダラ	25mg/m2	30min	d1-5		グラニセトロン
移植前処置	移植前処置 Flu30(5日間)	フルダラ	30mg/m2	30min	d1-5		グラニセトロン
移植前処置	移植前処置 Flu30(6日間)	フルダラ	30mg/m2	30min	d1-6		グラニセトロン
移植前処置	Auto PBSCT G-BEA	キロサイド キロサイド ブスルフェクス ペプシド フィルグラスチム フィルグラスチム	100mg/m2 3000mg/m2 3.2mg/kg 20mg/kg 200 μ g /m2 400 μ g /m2	24hr 3hr 3hr 2hr	d2-7 d8-9 d2-5 d6-7 d1-5 d6-7		グラニセトロン ステロイド点眼 レベチラセタム錠

登録疾患名	レジメ名	抗がん薬名 (※は非抗がん薬)	用法・用量	投与時間	スケジュール	1コースの周期	前処置等
移植前処置	Auto PBSCT MCEC	サイメリン ペブシド カルボプラチン エンドキサン ※ウロミテキサン	200mg/m2 500mg/m2 300mg/m2 50mg/kg 20m/kg *3回	1hr 2hr 2hr 3hr iv	d1 d2-5 d3-5 d6-7 d6-7		グラニセトロン
移植前処置	Auto PBSCT MEAM	サイメリン キロサイド ペブシド アルケラン	300mg/m2 2g/m2 200mg/m2 140mg/m2	1hr 3hr 2hr 30min	d1 d3-4 d2-5 d6		グラニセトロン ステロイド点眼
移植前処置	移植前処置 チオテバ	チオテバ	5mg/kg	2hr	d1-2		グラニセトロン
移植前処置	移植前処置 BU	ブスルファン	3.2mg/kg	3hr	d1-4		グラニセトロン レベチラセタム錠
移植前処置	移植前処置 MEL40	アルケラン	40mg/m2	30min	d1-2		アプレピタント グラニセトロン
移植前処置	移植前処置 MEL70	アルケラン	70mg/m2	30min	d1-2		アプレピタント グラニセトロン
移植前処置	移植前処置 MEL100	アルケラン	100mg/m2	30min	d1-2		アプレピタント グラニセトロン
移植前処置	移植前処置 LEED	ペブシド エンドキサン ※ウロミテキサン アルケラン デキサメタゾン	500mg/m2 60mg/kg 24mg/kg*3回 130mg/m2 40mg/body	2hr 2hr 30min 30min 30min	d1-3 d1-2 d1-2 d4 d1-4		グラニセトロン
移植前処置	移植前処置 キロサイド	キロサイド	100mg/m2	24hr	d1-5		グラニセトロン
移植前処置	移植前処置 HD-AraC	キロサイド	2000mg/m2	3hr	d1-2		グラニセトロン
移植前処置	移植前処置 ペブシド 100	ペブシド	100mg/m2	2hr	d1-5		グラニセトロン
移植前処置	ATG療法(2.5mg/kg) (移植前処置)	サイモグロブリン	2.5mg/kg	12hr	d1-2(※初日は試験投与)		カロナール400mg ポララミン
急性リンパ性白血病	JSCT ALL/MRD 2023						
急性リンパ性白血病	Hyper CVAD療法	エンドキサン ※ウロミテキサン オンコピン ドキソルピシン デキサメタゾン	300mg/m2*3 600mg/m2 2mg/body 50mg/m2 40mg/body	3hr 24hr 全開 24hr 30min	d1-3 d1-3 d4,11 d4 d1-4	4W	アプレピタント グラニセトロン
急性リンパ性白血病	ベスポンサ	ベスポンサ	0.8mg/m2 0.5mg/m2 CRなら0.5mg/m2	1hr 1hr 1hr	d1 d8,15 d1,8,15	3W 4W	カロナール400mg ポララミン
急性リンパ性白血病	ビーリンサイト(BW45kg未満) 1コース目	ビーリンサイト ※デキサメタゾン	5μg/m2/day 20mg 15μg/m2/day 20mg	24hr 30min 24hr 30min	d1-7 d1 d8-28 d8	6W	
急性リンパ性白血病	ビーリンサイト(BW45kg未満) 2コース目以降	ビーリンサイト ※デキサメタゾン	15μg/m2/day 20mg	24hr 30min	d1-28 d1	6W	

登録疾患名	レジメン名	抗がん薬名（※は非抗がん薬）	用法・用量	投与時間	スケジュール	1コースの周期	前処置等
急性リンパ性白血病	ビーリンサイト(BW45kg以上) 1コース目	ビーリンサイト ※デキサメタゾン	9μg/day 28μg/day 20mg	24hr 24hr 30min	d1-7 d8-28 d1	6W	
急性リンパ性白血病	ビーリンサイト(BW45kg以上) 2コース目以降	ビーリンサイト ※デキサメタゾン	28μg/day 20mg	24hr 30min	d1-28 d1	6W	
急性リンパ性白血病	外来ビーリンサイト(BW45kg以上)	ビーリンサイト ビーリンサイト ※デキサメタゾン	84μg/body 112μg/body 20mg	72hr 96hr 30min	d1-28 d1	6W	
急性リンパ性白血病	アラノンジー	アラノンジー	1500mg/m2	2hr	d1,3,5	3W	グラニセトロン
急性骨髄性白血病	DNR+AraC療法（寛解導入）	ダウノマイシン キロサイド	50mg/m2 100mg/m2	30min 24hr	d1-5 d1-7	4W	グラニセトロン
急性骨髄性白血病	DNR+AraC療法（寛解導入）※3+7	ダウノマイシン キロサイド	60mg/m2 100mg/m2	30min 24hr	d1-3 d1-7	4W	グラニセトロン
急性骨髄性白血病	IDA+AraC療法（寛解導入）	イダマイシン キロサイド	12mg/m2 100mg/m2	30min 24hr	d1-3 d1-7	4W	グラニセトロン
急性骨髄性白血病	high-dose AraC療法	キロサイド	2000mg/m2 *2回	3hr	d1-5	4W	グラニセトロン ステロイド点眼
急性骨髄性白血病	地固め HD-AraC+キザルチニブ療法	キロサイド ヴァンフリタ	2000mg/m2 *2回 35.4mg	3hr p.o.	d1,3,5 d6-20	4W	グラニセトロン ステロイド点眼
急性骨髄性白血病	地固め①（MIT-AraC）	ノバントロン キロサイド	7mg/m2 200mg/m2	30min 24hr	d1-3 d1-5	4W	グラニセトロン
急性骨髄性白血病	地固め②（DNR-AraC）	ダウノマイシン キロサイド	50mg/m2 200mg/m2	30min 24hr	d1-3 d1-5	4W	グラニセトロン
急性骨髄性白血病	地固め③（ACR-AraC）	アクラシノン キロサイド	20mg/m2 200mg/m2	30min 24hr	d1-5 d1-5	4W	グラニセトロン
急性骨髄性白血病	地固め④（A Triple V）	ペプシド キロサイド オンコピン フィルデシン	100mg/m2 200mg/m2 0.8mg/m2 2mg/m2	1hr 24hr 全開 全開	d1-5 d1-5 d8 d10	4W	グラニセトロン
急性骨髄性白血病	CAG療法	アクラシノン キロサイド	14mg/m2 10mg/m2 *2回	30min s.c.または24hr	d1-5 d1-14	4W	グラニセトロン
急性骨髄性白血病	MEC療法	ノバントロン ペプシド キロサイド	6mg/m2 100mg/m2 100mg/m2	30min 2hr 24hr	d1-3 d1-5 d1-6	4W	グラニセトロン
急性骨髄性白血病	マイロターグ（マイロターグ）	マイロターグ	9mg/m2	2hr	d1,15	4W	カロナール500mg ポララミン ハイドロコト注
急性骨髄性白血病	アザシチジン+ベネトクラクス療法	アザシチジン ベネクレクタ	75mg/m2 100mg 200mg 400mg	10minまたはs.c. p.o. p.o. p.o.	d1-7 d1 d2 d3-	4W	グラニセトロンゼリー

登録疾患名	レジメナー名	抗がん薬名 (※は非抗がん薬)	用法・用量	投与時間	スケジュール	1コースの周期	前処置等
急性骨髄性白血病	AraC+ベネトクラクス療法	キロサイド ベネクレクスタ	10mg/m2 *2回 100mg 200mg 400mg 600mg	s.c. p.o. p.o. p.o. p.o.	d1-10 d1 d2 d3 d4-	4W	
急性骨髄性白血病	ピクセオス (寛解導入)	ピクセオス	100U/m2 100U/m2	90min 90min	d1,3,5 nonCR時d1,3	4W	グラニセトロン
急性骨髄性白血病	ピクセオス (地固め)	ピクセオス	65U/m2	90min	d1,3	4W	グラニセトロン
急性前骨髄性白血病	JALSG APL2021						
急性前骨髄性白血病	JALSG APL205R (寛解導入療法)	トリセノックス ベザノイド	0.15mg/kg 45mg/m2	2hr p.o.	d15-until CR(max day74) d1-14までを先行内服。 (until CR max day74)	until CR (max d74)	
急性前骨髄性白血病	JALSG APL205R (地固め)	トリセノックス	0.15mg/kg	2hr	d1-5,d8-12,d15-19,d22-26	5W	
血球貪食症候群	エトボシド(慢性活動性EBウイルス感染症)	ベブシド	150mg/m2	2hr	d1	1W	グラニセトロン
血球貪食症候群	エトボシド(50mg/m2)	ベブシド	50mg/m2	2hr	d1	1d	グラニセトロン
骨髄異形成症候群	アザシチジン	アザシチジン	75mg/m2		d1-7	4W	グラニセトロンゼリー
髄注	髄注 (ATL, AML, APL)	メントレキセート キロサイド プレドニゾロン	15mg/body 40mg/body 10mg/body	IT	d1		
髄注	髄注 (ALL)	メントレキセート キロサイド デキサメタゾン	15mg/body 40mg/body 3.3mg/body	IT	d1		
成人T細胞性白血病/リンパ腫	ポテリジオ	ポテリジオ	1mg/kg	2hr	d1	1W	コロナール400mg ポララミン
成人T細胞性白血病/リンパ腫	mLSG15療法	a)ドキソルピシン オンコピン エンドキサン プレドニゾロン b)サイメリン ドキソルピシン c)フィルデシン ベブシド カルボプラチン プレドニゾロン	a)40mg/m2 1mg/m2 350mg/m2 60mg/body b)60mg/m2 30mg/m2 c)2.4mg/m2 100mg/m2 250mg/m2 40mg/m2	30min 全開 3hr 30min 全開 30min 全開 1hr 3hr 30min	d1 d1 d1 d1-3 d1 d1 d1 d1-3 d1 d1-3	4W	
成人T細胞性白血病/リンパ腫	アドセトリス	アドセトリス	1.8mg/kg	30min	d1	3W	コロナール400mg ポララミン
成人T細胞性白血病/リンパ腫	コホリン (ベントスタチン)	コホリン	5mg/m2	全開	d1,8,15,21	4W	
多発性骨髄腫	ELd療法(1-2コース目)	エムブリシティ レブラミド デキサメタゾン デキサメタゾン錠	10mg/kg 25mg 28mg 8mg	流量指示通り p.o. 30min p.o.	d1,8,15,22 d1-21 d0,7,14,21 d1,8,15,21	4W	コロナール400mg ポララミン

登録疾患名	レジメ名	抗がん薬名（※は非抗がん薬）	用法・用量	投与時間	スケジュール	1コースの周期	前処置等
多発性骨髄腫	ELd療法(3コース目以降)	エムブリシチ レブラミド デキサメタゾン デキサメタゾン錠	10mg/kg 25mg 28mg 8mg	流量指示通り p.o. 30min p.o.	d1,15 d1-21 d0,7,14,21 d1,8,15,21	4W	コロナール400mg ボララミン
多発性骨髄腫	EPd療法(1-2コース目)	エムブリシチ ボマリスト デキサメタゾン	10mg/kg 4/3/2/1mg 28mg	流量指示通り p.o. 30min	d1,8,15,22 d1-21 d1,8,15,22	4W	コロナール400mg ボララミン
多発性骨髄腫	EPd療法(3コース目以降)	エムブリシチ ボマリスト デキサメタゾン	10mg/kg 4/3/2/1mg 28mg	流量指示通り p.o. 30min	d1,15 d1-21 d1,8,15,22	4W	コロナール400mg ボララミン
多発性骨髄腫	DBd療法(1-3コース目)	ダラザレックス ボルテゾミブ デキサメタゾン	16mg/kg 1.3mg/m2 20mg	流量指示通り s.c. 30min	d1,8,15 d1,4,8,11 d1,2,4,5,d8,9,11,12	3W	コロナール1000mg ボララミン
多発性骨髄腫	DBd療法(4-8コース目)	ダラザレックス ボルテゾミブ デキサメタゾン	16mg/kg 1.3mg/m2 20mg	流量指示通り s.c. 30min	d1 d1,4,8,11 d1,2,4,5,d8,9,11,12	3W	コロナール1000mg ボララミン
多発性骨髄腫	DCd療法(1コース目)	ダラザレックス カイプロリス デキサメタゾン	8mg/kg 16mg/kg 20mg/m2 56mg/m2 20mg 40mg	流量指示通り 流量指示通り 30min 30min 30min 30min	d1-2, d8,15,22, d1-2 d8-9,15-16 d1-2, d8-9, d15-16, d22	4W	コロナール1000mg ボララミン
多発性骨髄腫	DCd療法(2コース目)	ダラザレックス カイプロリス デキサメタゾン	16mg/kg 56mg/m2 20mg 40mg	流量指示通り 30min 30min 30min	d1,8,15,22, d1-2,8-9,15-16 d1-2, d8-9, d15-16, d22	4W	コロナール1000mg ボララミン
多発性骨髄腫	DCd療法(3-6コース目)	ダラザレックス カイプロリス デキサメタゾン	16mg/kg 56mg/m2 20mg 40mg	流量指示通り 30min 30min 30min	d1,15 d1-2,8-9,15-16 d1-2, d8-9, d15-16, d22	4W	コロナール1000mg ボララミン
多発性骨髄腫	DCd療法(7コース目以降)	ダラザレックス カイプロリス デキサメタゾン	16mg/kg 56mg/m2 20mg 40mg	流量指示通り 30min 30min 30min	d1 d1-2,8-9,15-16 d1-2, d8-9, d15-16, d22	4W	コロナール1000mg ボララミン
多発性骨髄腫	DLd療法(1コース目)	ダラザレックス レブラミド デキサメタゾン	8mg/kg 16mg/kg 25mg/day 20mg	流量指示通り 流量指示通り p.o. 30min	d1 d8,15,22, d1-21 d1-2, d8-9, d15-16, d22-23	4W	コロナール1000mg ボララミン
多発性骨髄腫	DLd療法(2コース目以降)	ダラザレックス レブラミド デキサメタゾン	16mg/kg 25mg/day 20mg	流量指示通り p.o. 30min	d1,8,15,22, d1-21 d1-2, d8-9, d15-16, d22-23	4W	コロナール1000mg ボララミン

登録疾患名	レジメン名	抗がん薬名（※は非抗がん薬）	用法・用量	投与時間	スケジュール	1コースの周期	前処置等
多発性骨髄腫	KRd療法(1コース目)	カイプロリス レブラミド デキサメタゾン	20mg/m2 27mg/m2 25mg/day 40mg	30min 30min p.o. 30min	d1-2 d8-9,15-16 d1-21 d1,8,15,22	4W	
多発性骨髄腫	KRd療法(2コース目以降)	カイプロリス レブラミド デキサメタゾン	27mg/m2 25mg/day 40mg	30min p.o. 30min	d1-2,8-9,15-16 d1-21 d1,8,15,22	4W	
多発性骨髄腫	Kd療法(1コース目)	カイプロリス デキサメタゾン	20mg/m2 56mg/m2 20mg	30min 30min 30min	d1-2 d8-9,15-16 d1,8,15,22	4W	
多発性骨髄腫	wKd療法(1コース目)	カイプロリス デキサメタゾン	20mg/m2 70mg/m2 40mg	30min 30min 30min	d1, d8,15, d1,8,15,22	4W	
多発性骨髄腫	IsaKd療法(1コース目)	サークリサ カイプロリス デキサメタゾン	10mg/kg 20mg/m2 56mg/m2 20mg	流量指示通り 30min 30min 30min	d1,8,15,22 d1-2 d8-9,15-16、 d1-2,8-9,15-16,22-23	4W	コロナール1000mg ボララミン
多発性骨髄腫	IsaKd療法(2コース目以降)	サークリサ カイプロリス デキサメタゾン	10mg/kg 56mg/m2 20mg	流量指示通り 30min 30min	d1,15 d1-2,8-9,15-16、 d1-2,8-9,15-16,22-23	4W	コロナール1000mg ボララミン
多発性骨髄腫	IsaPd療法(1コース目)	サークリサ ボマリスト デキサメタゾン	10mg/kg 4/3/2/1mg/day 20mg	流量指示通り p.o. 30min	d1,8,15,22、 d1-21 d1,8,15,22	4W	コロナール1000mg ボララミン
多発性骨髄腫	IsaPd療法(2コース目)	サークリサ ボマリスト デキサメタゾン	10mg/kg 4/3/2/1mg/day 20mg	流量指示通り p.o. 30min	d1,15 d1-21 d1,8,15,22	4W	コロナール1000mg ボララミン
多発性骨髄腫	Isad療法(1コース目)	サークリサ デキサメタゾン	20mg/kg 20mg	流量指示通り 30min	d1,8,15,22、 d1,8,15,22	4W	コロナール1000mg ボララミン
多発性骨髄腫	Isad療法(2コース目以降)	サークリサ デキサメタゾン	20mg/kg 20mg	流量指示通り 30min	d1,15 d1,8,15,22	4W	コロナール1000mg ボララミン
多発性骨髄腫	IsaVRd療法(1コース目)	サークリサ ボルテゾミブ レブラミド デキサメタゾン	10mg/kg 1.3mg/m2 25mg/day 20mg	流量指示通り 30min 30min 30min	d1,8,15,22,29 d1,4,8,11,22,25,29,32 d1-14,22-35 d1-2,8-9,15-16,22-23,25- 26,29-30,32-33	6W	コロナール1000mg ボララミン
多発性骨髄腫	IsaVRd療法(2-4コース目)	サークリサ ボルテゾミブ レブラミド デキサメタゾン	10mg/kg 1.3mg/m2 25mg/day 20mg	流量指示通り 30min 30min 30min	d1,15,29 d1,4,8,11,22,25,29,32 d1-14,22-35 d1-2,8-9,15-16,22-23,25- 26,29-30,32-33	6W	コロナール1000mg ボララミン
多発性骨髄腫	ボルテゾミブ	ボルテゾミブ	1.3mg/m2	s.c.	d1,4,8,11	3W	
多発性骨髄腫	VCD療法（エンドキサン点滴）	ボルテゾミブ エンドキサン	1.3mg/m2 300mg/m2	s.c. 1hr	d1,4,8,11 d1,4,8,11	3W	

登録疾患名	レジメ名	抗がん薬名（※は非抗がん薬）	用法・用量	投与時間	スケジュール	1コースの周期	前処置等
多発性骨髄腫	Ds.c.Ld療法	ダラキューロ レブラミド デキサメタゾン	1800mg/body 25mg/day 20mg	s.c. p.o. 30min	C1-2:d1,8,15,22, C3- 6:d1,15, C7-:d1、 d1-21 d1-2, d8-9, d15-16, d22-23	4W	コロナール1000mg ボララミン
多発性骨髄腫	Ds.c.Bd療法(1-3コース目)	ダラキューロ ボルテゾミブ デキサメタゾン	1800mg/body 1.3mg/m2 20mg	s.c. s.c. 30min	d1,8,15 d1,4,8,11、 d1,2,4,5,8,9,11,12	3W	コロナール1000mg ボララミン
多発性骨髄腫	Ds.c.Bd療法(4-8コース目)	ダラキューロ ボルテゾミブ デキサメタゾン	1800mg/body 1.3mg/m2 20mg	s.c. s.c. 30min	d1,15 d1,4,8,11、 d1,2,4,5,8,9,11,12	3W	コロナール1000mg ボララミン
多発性骨髄腫	Ds.c.Bd療法(9コース目以降)	ダラキューロ ボルテゾミブ デキサメタゾン	1800mg/body 1.3mg/m2 20mg	s.c. s.c. 30min	d1 d1,4,8,11、 d1,2,4,5,8,9,11,12	3W	コロナール1000mg ボララミン
多発性骨髄腫	Ds.c.Cd療法(1コース目)	ダラキューロ カイプロリス デキサメタゾン	1800mg/body 20mg/m2 56mg/m2 20mg 40mg	s.c. 30min 30min 30min	d1,15 d1-2 d8-9,15-16 d1-2, d8-9, d15-16, d22	4W	コロナール1000mg ボララミン
多発性骨髄腫	Ds.c.Cd療法(2コース目)	ダラキューロ カイプロリス デキサメタゾン	1800mg/body 56mg/m2 20mg 40mg	s.c. 30min 30min 30min	d1,8,15,22 d1-2,8-9,15-16 d1-2, d8-9, d15-16, d22	4W	コロナール1000mg ボララミン
多発性骨髄腫	Ds.c.Cd療法(3-6コース目)	ダラキューロ カイプロリス デキサメタゾン	1800mg/body 56mg/m2 20mg 40mg	s.c. 30min 30min 30min	d1,15 d1-2,8-9,15-16 d1-2, d8-9, d15-16, d22	4W	コロナール1000mg ボララミン
多発性骨髄腫	エルレフィオ(1コース目)	エルレフィオ ※デキサート	12mg 32mg 76mg 20mg	s.c. s.c. s.c. 30min	d1 d4 d8,15,22 d1,4,8	4W	コロナール1000mg ボララミン
多発性骨髄腫	エルレフィオ(2-6コース目)	エルレフィオ	76mg	s.c.	d1,8,15,22	4W	コロナール1000mg ボララミン
中枢神経系リンパ腫	MVP療法	メントレキセート オンコピン ※アイソボリン プロカルバジン	3500mg/m2 1.4mg/m2 12.5mg/body*3回 100mg/m2	3hr 全開 全開 p.o.	d1 d1 d1-4 d1-7	3W	パロノセトロン
中枢神経系リンパ腫	HD-MTX療法	メントレキセート ※アイソボリン	350mg/m2 3150mg/m2 7.5mg/body*4回	30min 23.5hr 全開	d1 d1 d1-4	3W	パロノセトロン
中枢神経系リンパ腫	CYVE療法	キロサイド キロサイド ペブシド	50mg/m2 *2回 2000mg/m2 200mg/m2	12hr 3hr 2hr	d1-5 d3-6 d3-6	3W	グラニセトロン ステロイド点眼
低悪性リンパ腫/MCL	ゼヴァリンイットリウム(90Y)						
低悪性リンパ腫/MCL	ゼヴァリンインジウム(111In)						

登録疾患名	レジメナー名	抗がん薬名（※は非抗がん薬）	用法・用量	投与時間	スケジュール	1コースの周期	前処置等	
低悪性リンパ腫/MCL	リツキサン療法(ゼヴァリン前投与)	リツキシマブ	250mg/m2		流量指示通り	d1	1W	カロナール400mg ボララミン
特発性血小板減少性紫斑病	リツキシマブ療法	リツキシマブ	375mg/m2		流量指示通り	d1	1W	カロナール400mg ボララミン
血栓性血小板減少性紫斑病	リツキシマブ療法	リツキシマブ	375mg/m2		流量指示通り	d1	1W	カロナール400mg ボララミン
非ホジキンリンパ腫	CHOP療法	ドキシソルピシン オンコピン エンドキサン プレドニゾン	50mg/m2 1.4mg/m2 750mg/m2 100mg/body	30min 全開 3hr 30min	d1 d1 d1 d1-5	3W	アプレピタント グラニセトロン	
非ホジキンリンパ腫	High-CHOP療法	ドキシソルピシン オンコピン エンドキサン プレドニゾン デキサート注 ※フィルグラスチム ※ウロミテキサン	75mg/m2 1.4mg/m2 1500mg/m2 100mg/body 40mg/body 100μg/m2/day 600mg/m2 × q4hr	30min 全開 2.5hr 30min 30min s.c. iv	d3 d3 d3 d3-7 d1,15 d6- d3	3W	アプレピタント グラニセトロン	
非ホジキンリンパ腫	CHOEP療法	ドキシソルピシン オンコピン エンドキサン ベブシド プレドニゾン	50mg/m2 1.4mg/m2 750mg/m2 100mg/m2 100mg/body	30min 全開 3hr 1hr 30min	d1 d1 d1 d1-3 d1-5	3W	アプレピタント グラニセトロン	
非ホジキンリンパ腫	THP-COP療法	テラルピシン オンコピン エンドキサン プレドニゾン	50mg/m2 1.4mg/m2 750mg/m2 100mg/body	30min 全開 3hr 30min	d1 d1 d1 d1-5	3W	アプレピタント グラニセトロン	
非ホジキンリンパ腫	アドセトリス+CHP療法	アドセトリス ドキシソルピシン エンドキサン プレドニゾン	1.8mg/kg 50mg/m2 750mg/m2 100mg d1-5	30min 30min 3hr 30min	d1 d1 d1 d1-5	3W	アプレピタント カロナール (200) ボララミン	
非ホジキンリンパ腫	Hyper-CVAD療法	エンドキサン ※ウロミテキサン ドキシソルピシン オンコピン デキサメタゾン	300mg/m2 *2回 600mg/m2 16.7mg/m2 1.4mg/m2 40mg	3hr 24hr 全開 24hr 30min	d1-3 d1-3 d4-6 d4,11 d1-4,11-14	3W	アプレピタント グラニセトロン	
非ホジキンリンパ腫	MA療法	メソトレキセート キロサイド ※アイソボリン メチルプレドニゾン メソトレキセート キロサイド	200mg/m2 800mg/m2 3000mg/m2*2回 7.5mg/body*4回 60mg*2回 12mg/body 100mg/body	2hr 22hr 3hr 全開 30min IT IT	d1 d1 d2-3 d2-4 d1-3 d2 d8	3W	パロノセトロン	

登録疾患名	レジメナー名	抗がん薬名 (※は非抗がん薬)	用法・用量	投与時間	スケジュール	1コースの周期	前処置等
非ホジキンリンパ腫	DeVIC療法	ベプシド イホマイド カルボプラチン ※ウロミテキサン デキサメタゾン	100mg/m2 1500mg/m2 300mg/m2 300mg/m2 *3回 40mg	1hr 3hr 3hr iv 30min	d1-3 d1-3 d1 d1-3 d1-3	4W	グラニセトロン
非ホジキンリンパ腫	EPOCH療法	ベプシド ドキソルピシン+オンコピン エンドキサン プレドニゾロン	50mg/m2 10mg/m2+0.4mg/m2 750mg/m2 60mg/m2	24hr 24hr 3hr 30min	d1-4 d1-4 d5 d1-5	3W	グラニセトロン
非ホジキンリンパ腫	GCD療法	ゲムシタピン カルボプラチン デキサメタゾン	1000mg/m2 75mg/m2 40mg/body	30min 1hr 30min	d1,8 d1, d1-4	3W	グラニセトロン パロノセトロン アプレピタント
非ホジキンリンパ腫	GDP療法	ゲムシタピン シスプラチン デキサメタゾン	1000mg/m2 75mg/m2 40mg/body	30min 4hr 30min	d1,8 d1, d1-4	3W	グラニセトロン パロノセトロン アプレピタント
非ホジキンリンパ腫	ESHAP療法	ベプシド シスプラチン キロサイド ソルメドロール	40mg/m2 25mg/m2 2,000mg/m2 500mg/body	1hr 24hr 3hr 1hr	d1-4 d1-4 d5 d1-5	4W	グラニセトロン ステロイド点眼
非ホジキンリンパ腫	Pola-CHP療法	ポライビー ドキソルピシン エンドキサン プレドニゾロン	1.8mg/kg 50mg/m2 750mg/m2 100mg	初回90min, 以降30min 30min 3hr 30min	d1 d1 d1 d1-5	3W	アプレピタント グラニセトロン
非ホジキンリンパ腫	SMILE療法(crisantaspace)	メントレキセート アイソポリン ベプシド ウロミテキサン イホマイド アーウィナーゼ デキサメタゾン	2000mg/m2 7.5mg/body *8回 100mg/m2 300mg/m2 *3回 1500mg/m2 12000U/m2 40mg/body	6hr 全開 2hr iv 2hr im 30min	d1 d2-5 d2-4 d2-4 d2-4 d8,10,12,14,16,18,20 d1-4	4W	グラニセトロン アプレピタント G-CSF
非ホジキンリンパ腫	ガザイバ療法(1コース目)	ガザイバ	1000mg/body	流量指示通り	d1,8,15	CHOP+ 3W Benda+ 4W	カロナール1000mg ボララミン
非ホジキンリンパ腫	ベンダムスチン療法 (ポライビー-BR)	(1コース目) リツキシマブ ポライビー トレアキシン (2コース目以降) リツキシマブ ポライビー トレアキシン	(1コース目) 375mg/m2 1.8mg/kg 90mg/m2 (2コース目以降) 375mg/m2 1.8mg/kg 90mg/m2	流量指示通り 90min 10min 流量指示通り 30min 10min	(1コース目) d1 d2, d2-3 (2コース目以降) d1, d1, d1-2	3W	アプレピタント グラニセトロン
非ホジキンリンパ腫	ベンダムスチン療法 (R or G併用)	トレアキシン	90mg/m2	10min	d1-2	4W	アプレピタント グラニセトロン
非ホジキンリンパ腫	ベンダムスチン療法 (R併用) ※DLBCL再発・難治用レジメナー	トレアキシン	120mg/m2	10min	d1-2	4W	アプレピタント グラニセトロン

登録疾患名	レジメ名	抗がん薬名 (※は非抗がん薬)	用法・用量	投与時間	スケジュール	1コースの周期	前処置等
非ホジキンリンパ腫	ボライビー療法 (ボライビー-RB用)	ボライビー	1.8mg/kg	90min 30min	d1	4W	コロナール400mg ボララミン
非ホジキンリンパ腫	MA療法	メントレキセート メントレキセート キロサイド ※アインボリン メントレキセート キロサイド	200mg/m2 800mg/m2 3000mg/m2 *2 7.5mg/body *4 12mg/body 100mg/body	2hr 22hr 3hr 全開 IT IT	d1 d1 d2-3 d2-4 d1 d8	4W	グラニセトロン アプレピタント ステロイド点眼 ダイアモックス錠
非ホジキンリンパ腫	アドセトリス (ALCL)	アドセトリス	1.8mg/kg	30min	d1	3W	コロナール400mg ボララミン
非ホジキンリンパ腫	アドセトリス (PTCLまたはCTCL)	アドセトリス	1.8mg/kg	30min	d1	3W	コロナール400mg ボララミン
非ホジキンリンパ腫	イストダックス	ロミデプシ	14mg/m2	4hr	d1,8,15	4W	グラニセトロン
非ホジキンリンパ腫	ロイスタチン	ロイスタチン	0.12mg/kg	2hr	d1-5	4W	
非ホジキンリンパ腫	CDE-11療法	ベプシド カンプト カルボプラチン デキサメタゾン	100m/m2 30mg/m2 250mg/m2 40mg/body	1hr 1hr 3hr 30min	d1-3 d1-3 d1 d1-3	4W	グラニセトロン
非ホジキンリンパ腫	CHASE療法	ベプシド エンドキサン キロサイド ※ウロミテキサン デキサメタゾン	100mg/m2 1200mg/m2 2000mg/m2 480mg/m2 *3 40mg/day	2hr 2.5hr 3hr iv 30min	d1-3 d1 d2-3 d1 d1-3	4W	グラニセトロン ステロイド点眼
非ホジキンリンパ腫	リツキシマブ療法	リツキシマブ	375mg/m2	流量指示通り	d1	1W or 4W	コロナール400mg ボララミン
非ホジキンリンパ腫	ジフォルタ	ジフォルタ	30mg/m2 iv	5min	d1,8,15,22,29,36	7W	バンピタン末 メチコバル注
非ホジキンリンパ腫	エプコリタマブ(1コース目)	エプキンリ ※デキサート	0.18mg 0.8mg 48mg 16mg	s.c.	d1 d8 d15,22 d1-4,8-11, 15-18, 22-25	4W	バス参照
非ホジキンリンパ腫	エプコリタマブ(2-3コース)	エプキンリ ※デキサート	48mg 16mg	s.c.	d1,8,15,22 ※必要時投与	4W	
非ホジキンリンパ腫	エプコリタマブ(4-9コース)	エプキンリ	48mg	s.c.	d1,15	4W	
非ホジキンリンパ腫	ダルビマス療法 (PTCL)	ダルビマス	300mg/m2	1hr	d1-5	3W	
慢性リンパ性白血病	リツキサン	リツキサン	初回：375mg/m2 2回目以降 500mg/m2 最 大6回まで	流量指示通り	d1	1W	コロナール400mg ボララミン
慢性リンパ性白血病	ペンダムスチン	トレアキシ	100mg/m2	10min	d1-2	4W	アプレピタント グラニセトロン
慢性リンパ性白血病	FC療法	フルダラ エンドキサン	25mg/m2 250mg/m2	30min 2hr	d1-3	4W	グラニセトロン

登録疾患名	レジメン名	抗がん薬名（※は非抗がん薬）	用法・用量	投与時間	スケジュール	1コースの周期	前処置等
慢性リンパ性白血病	ガザイバ+カルケンス療法(1コース目)	ガザイバ カルケンス プレドニゾン	100mg/body 900mg/body 1000mg/body 200mg/day 100mg	4hr 流量指示通り 流量指示通り 流量指示通り p.o. 30min	d1 d2 d8,15 d1-28 d1	4W	コロナール1000mg ポラミン
慢性リンパ性白血病	ロイスタチン療法（ヘアリーセル）	ロイスタチン	0.09mg/kg	24hr	d1-7	4W	※グラニセトロン
骨髄増殖性腫瘍	サイメリン療法	サイメリン	100mg/body	30min	d1		

登録疾患名	治療ライン	レジメン名	抗がん薬名	用法・用量	投与時間	スケジュール	1コースの周期	前処置等
食道癌	1st～	DCF療法	5FU ドセタキセル シスプラチン	350mg/m2 60mg/m2 6mg/m2	24hr 90min 2hr	d1-5 d1 d1-5	q4W	グラニセトロン デキサート アプレピタント
胃癌	1st～	トラスツマブ +XP療法	トラスツマブ シスプラチン カベシタピン	(初回) 8mg/kg (2回目以降) 6mg/kg 80mg/m2 2000mg/m2/day	90min 60min(30min) 2hr p.o. b.i.d	d1 d1 d1 d1-14	q3W	パロノセトロン デキサート アプレピタント
胃癌	1st～	SOX+トラスツマブ療法	トラスツマブ オキサリプラチン S1	(初回) 8mg/kg (2回目以降) 6mg/kg 100mg/m2 80mg/m2/day	90min 60min(30min) 2hr p.o. b.i.d	d1 d1 d1 d1-14	q3W	パロノセトロン デキサート アプレピタント
胃癌	1st～	G-SOX療法	オキサリプラチン S1	100mg/m2 80mg/m2/day	2hr p.o. b.i.d.	d1 d1-14	q3W	グラニセトロン デキサート アプレピタント
胃癌	1st～	G-SOX+Nivo療法	オプジーボ オキサリプラチン S1	360mg/body 100mg/m2 80mg/m2/day	30min 2hr p.o. b.i.d.	d1 d1 d1-14	q3W	カロナール ボラミン グラニセトロン デキサート アプレピタント
胃癌	1st～	G-SOX+Pembro療法	キイトルーダ オキサリプラチン S1	200mg/body 100mg/m2 80mg/m2/day	30min 2hr p.o. b.i.d.	d1 d1 d1-14	q3W	カロナール ボラミン グラニセトロン デキサート アプレピタント
胃癌	1st～	G-SOX+ゾレクシマブ療法	ピロイ オキサリプラチン S1	(初回)800mg/m2 (2回目以降)600mg/m2 100mg/m2 80mg/m2/day	流量指示通り 2hr p.o. b.i.d.	d1 d1 d1-14	q3W	グラニセトロン アロカリス デキサート ブリンペラン アタラックスP
胃癌	1st～	G-CAPOX療法	オキサリプラチン カベシタピン	100mg/m2 2000mg/m2/day	2hr p.o. b.i.d.	d1 d1-14	q3W	グラニセトロン デキサート アプレピタント
胃癌	1st～	CDDP+S1療法	シスプラチン S1	80mg/m2 80mg/m2/day	2hr p.o. b.i.d.	d8 d1-14	q3W	パロノセトロン デキサート アプレピタント
胃癌	2nd～	トラスツマブ	トラスツマブ	(初回) 8mg/kg (2回目以降) 6mg/kg	90min	d1	q3W	カロナール ボラミン
胃癌	2nd～	サイラムザ+パクリタキセル療法	サイラムザ パクリタキセル	8mg/kg 80mg/m2	(初回)60min(2回目以降) 30min 90min	d1,15 d1,8,15	q4W	レスタミンコーワ グラニセトロン デキサート ファモチジン
胃癌	2nd～	サイラムザ+アブラキサン療法	サイラムザ アブラキサン	8mg/kg 100mg/m2	(初回)60min(2回目以降) 30min 30min	d1,15 d1,8,15	q4W	ボラミン グラニセトロン デキサート
胃癌	2nd～	アブラキサン	アブラキサン	100mg/m2	30min	d1,8,15	q4W	グラニセトロン

登録疾患名	治療ライン	レジメン名	抗がん薬名	用法・用量	投与時間	スケジュール	1コースの周期	前処置等
胃癌	2nd～	wPTX療法	バクリタキセル	80mg/m2	1hr	d1,8,15	q4W	レスタミンコーワ ファモチジン デキサート
胃癌	2nd～	CPT-11療法（隔週）	イリノテカン	150mg/m2	2hr	d1	q2W	グラニセトロン デキサート
胃癌	3rd～	RAM+ロンサーフ療法	サイラムザ ロンサーフ	8mg/kg 70mg/m2/day	(初回)60min(2回目以降) 30min p.o. b.i.d	d1,15 d1-5,15-19(5投9休を2回繰り返す)	q4w	レスタミンコーワ
胃癌	3rd～	NIVO	オプジーボ	240mg/body	30min	d1	q2W	カロナール ボラミン
胃癌	4rd～	NIVO（4週毎）	オプジーボ	480mg/body	30min	d1	q4W	カロナール ボラミン
胃癌	4rd～	DTX	ドセタキセル	60mg/m2	1hr	d1	q3W	デキサート
胃癌	adjuvant	DTX+S1(START-2)療法	ドセタキセル S1	40mg/m2 80mg/m2/day	1hr p.o. b.i.d	d1 d1-14	q3W	グラニセトロン デキサート
大腸癌	1st/adjuvant	CAPOX療法	オキサリプラチン カベシタピン	130mg/m2 2000mg/m2/day	2hr p.o. b.i.d.	d1 d1-14	q3W	グラニセトロン デキサート アプレビタント デカドロン錠 ピロドキシサル錠
大腸癌	1st/adjuvant	SOX療法	S1 オキサリプラチン	80mg/m2/day 130mg/m2	p.o. b.i.d 2hr	d-14 d1	q3W	グラニセトロン デキサート アプレビタント デカドロン錠
大腸癌	1st～	BEV+FOLFOXIRI療法	ベバシズマブ レポホリナート イリノテカン オキサリプラチン 5FU	5mg/kg 200mg/m2 150mg/m2 85mg/m2 2400mg/m2 cont	(初回)90min(2回目)60min(3回目以 降)30min 2hr 1hr 2hr 46hr	d1 d1 d1 d1 d1-2	q2W	グラニセトロン デキサート アプレビタント デカドロン錠
大腸癌	1st～	BEV+mFOLFOX6療法	ベバシズマブ レポホリナート オキサリプラチン 5FU	5mg/kg 200mg/m2 85mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2 cont46hr	(初回)90min(2回目)60min(3回目以 降)30min 2hr 2hr 30min 46hr	d1 d1 d1 d1 d1-2	q2W	グラニセトロン デキサート アプレビタント デカドロン錠
大腸癌	1st～	BEV+CAPOX療法	ベバシズマブ オキサリプラチン カベシタピン	7.5mg/kg 130mg/m2 2000mg/m2/day	(初回)90min(2回目)60min(3回目以 降)30min 2hr p.o. b.i.d	d1 d1 d1-14	q3W	グラニセトロン デキサート アプレビタント デカドロン錠 ピロドキシサル錠 ヘパリン類似物質クリーム
大腸癌	1st～	BEV+CAPIRI療法	ベバシズマブ イリノテカン カベシタピン	7.5mg/kg 200mg/m2 1600mg/m2	(初回)90min(2回目)60min(3回目以 降)30min 90min p.o. b.i.d	d1 d1 d1-14	q3W	グラニセトロン デキサート アプレビタント デカドロン錠 ピロドキシサル錠 ヘパリン類似物質クリーム

登録疾患名	治療ライン	レジメン名	抗がん薬名	用法・用量	投与時間	スケジュール	1コースの周期	前処置等
大腸癌	1st～	BEV+SOX療法	ベバシズマブ オキサリプラチン S1	7.5mg/kg 130mg/m2 80mg/m2/day	(初回)90min(2回目)60min(3回目以降)30min 90min p.o. b.i.d	d1 d1 d1-14	q3W	グラニセトロン デキサート アプレピタント デカドロン錠
大腸癌	1st～	BEV+(S1またはCape)	ベバシズマブ カベシタピン S1	7.5mg/kg 2000mg/m2/day 80mg/m2/day	(初回)90min(2回目)60min(3回目以降)30min 90min p.o b.i.d	d1 d1 d1-14	q3W	
大腸癌	1st～	PANI+FOLFIRI療法	ベクティビックス イリノテカン レポホリナート 5-FU	6mg/kg 150mg/m2 200mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2 cont	1hr 90min 2hr 30min 46hr	d1 d1 d1 d1 d1-2	q2W	パロノセトロン デキサート アプレピタント デカドロン錠 ミノマイシンカプセル ヘパリン類似物質クリーム
大腸癌	1st～	PANI+mFOLFOX6療法	ベクティビックス オキサリプラチン レポホリナート 5-FU	6mg/kg 85mg/m2 200mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2 cont46hr	1hr 2hr 2hr 30min 46hr	d1 d1 d1 d1 d1-2	q2W	パロノセトロン デキサート アプレピタント デカドロン錠 ミノマイシンカプセル ヘパリン類似物質クリーム
大腸癌	1st～	CET+mFOLFOX6療法	アービタックス オキサリプラチン レポホリナート 5-FU	500mg/m2 85mg/m2 200mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2 cont46hr	2hr 2hr 2hr 30min 46hr	d1 d1 d1 d1 d1-2	q2W	パロノセトロン デキサート アプレピタント デカドロン錠 ミノマイシンカプセル ヘパリン類似物質クリーム
大腸癌	1st～	CET+FOLFIRI療法	アービタックス イリノテカン レポホリナート 5-FU	500mg/m2 150mg/m2 200mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2 cont46hr	2hr 90min 2hr 30min 46hr	d1 d1 d1 d1 d1-2	q2W	パロノセトロン デキサート アプレピタント デカドロン錠 ミノマイシンカプセル ヘパリン類似物質クリーム
大腸癌	1st～	mFOLFOX6療法	レポホリナート オキサリプラチン 5FU	200mg/m2 85mg/m2 400mg/m2 2500mg/m2 cont 46hr	2hr 2hr 30min 46hr	d1 d1 d1 d1-2	q2W	パロノセトロン デキサート アプレピタント デカドロン錠
大腸癌	1st～	FOLFIRI療法	イリノテカン レポホリナート 5FU	150mg/m2 200mg/m2 400mg/m2 2500mg/m2 cont 46hr	90min 2hr 30min 46hr	d1 d1 d1 d1-2	q2W	パロノセトロン デキサート アプレピタント デカドロン錠
大腸癌	2nd～	ベ'ルツ'マブ +トラスツズマブ (初回)	バージェタ トラスツズマブ	840mg/body 8mg/kg	1hr 90min	d1	q3W	カロナール錠 ボララミン錠
大腸癌	2nd～	ベ'ルツ'マブ +トラスツズマブ (2コース目～)	バージェタ トラスツズマブ	420mg/body 6mg/kg	30min 30min	d1	q3W	カロナール錠 ボララミン錠
大腸癌	2nd～	CET+メト' +レ'ラト'ビ 療法 (初回)	アービタックス メクトビ ピラフトビ	400mg/m2 90mg/day 300mg/day	2hr p.o. b.i.d. p.o. s.i.d	d1 d1 d1-2	q2W	レスタミンコーワ ミノマイシンカプセル ヘパリン類似物質クリーム

登録疾患名	治療ライン	レジメン名	抗がん薬名	用法・用量	投与時間	スケジュール	1コースの周期	前処置等
大腸癌	2nd～	CET+メトビ+ピラフトビ療法(2コース目～)	アービタックス メクトビ ピラフトビ	250mg/m2 90mg/day 300mg/day	2hr p.o. b.i.d. p.o. s.i.d	d1 d1-7 d1-7	q1W	レスタミンコーワ ミノマイシンカプセル ヘパリン類似物質クリーム
大腸癌	2nd～	RAM+FOLFIRI療法	サイラムザ イリノテカン レボホリナート 5-FU	8mg/kg 150mg/m2 200mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2 cont	1hr 90min 2hr 30min 46hr	d1 d1 d1 d1 d1-2	q2W	パロノセトロン ボラミン注 デキサート アプレビタント デカドロン錠
大腸癌	2nd～	AFL+FOLFIRI療法	ザルトラップ イリノテカン レボホリナート 5FU	4mg/kg 150mg/m2 200mg/m2, 400mg/m2 2400mg/m2 cont	1hr 90min 2hr 30min 46hr	d1 d1 d1 d1 d1-2	q2W	パロノセトロン デキサート アプレビタント デカドロン錠
大腸癌	2nd～	BEV+IRIS療法	ベバシズマブ イリノテカン S1	5mg/kg 100mg/m2 80mg/m2/day	(初回)90min(2回目)60min(3回目以降)30min 90min p.o. b.i.d	d1,15 d1,15 d1,15	q4W	グラニセトロン デキサート アプレビタント デカドロン錠
大腸癌	2nd～	BEV+FL療法	ベバシズマブ レボホリナート 5FU	5mg/kg 200mg/m2 2400mg/m2 cont	(初回)90min(2回目)60min(3回目以降)30min 2hr 46hr	d1 d1 d1-2	q2W	グラニセトロン デキサート アプレビタント デカドロン錠
大腸癌	2nd～	PANI+IRI療法	ベクティビックス イリノテカン	6mg/kg 150mg/m2	1hr 90min	d1 d1	q2W	グラニセトロン デキサート アプレビタント デカドロン錠 ミノマイシンカプセル ヘパリン類似物質クリーム
大腸癌	3rd～	BEV+ロンサーフ療法	ベバシズマブ ロンサーフ	5mg/kg 70mg/m2/day	(初回)90min(2回目)60min(3回目以降)30min p.o. b.i.d	d1,15 d1-5,15-19(5投9休を2回繰り返す)	q4w	
大腸癌	3rd～	CET単剤 2週毎	アービタックス	500mg/m2	2hr	d1	q2W	レスタミンコーワ ミノマイシンカプセル ヘパリン類似物質クリーム
大腸癌	3rd～	CET+IRI療法(2週毎)	イリノテカン アービタックス	150mg/m2 500mg/m2	90min 2hr	d1 d1	q2W	レスタミンコーワ ミノマイシンカプセル ヘパリン類似物質クリーム
大腸癌	3rd～	PANI単剤	ベクティビックス	6mg/kg	1hr	d1	q2W	レスタミンコーワ ミノマイシンカプセル ヘパリン類似物質クリーム
胆道癌	1st～	GEM+CDDP療法	ゲムシタピン シスプラチン	1000mg/m2 25mg/m2	30min 30min	d1,8 d1,8	q3W	パロノセトロン デキサート アプレビタント デカドロン錠
膵癌	1st～	GEM+S1(GEST試験)	ゲムシタピン S1	1000mg/m2 80mg/m2/day	30min p.o. b.i.d	d1,8 d1-14	q3W	グラニセトロン

登録疾患名	治療ライン	レジメン名	抗がん薬名	用法・用量	投与時間	スケジュール	1コースの周期	前処置等
肺癌	1st~	FOLFIRINOX療法	オキサリプラチン レボホリナート イリノテカン 5-FU	85mg/m2 200mg/m2 180mg/m2 400mg/m2 2400mg/m2 cont	2hr 2hr 90min 30min 46hr	d1 d1 d1 d1-2	q2W	パロノセトロン デキサート アプレピタント デカドロン錠
肺癌	2nd~	オニバイド +5FU/LV療法	オニバイド レボホリナート 5FU	70mg/m2 200mg/m2 2400mg/m2 cont	90min 2hr 46hr	d1 d1 d1-2	q2W	パロノセトロン デキサート アプレピタント デカドロン錠
MSI-High	MSI-High	Pembro(6週毎)	キイトルーダ	400mg/body	30min	d1	q6W	
MSI-High	MSI-High	Pembro	キイトルーダ	200mg/body	30min	d1	q3W	
肛門扁平上皮癌		MMC+Cape(+RT)療法	マイトマイシン カベシタピン	12mg/m2 825mg/m2/day	全開 p.o. b.i.d	d1 d1-5,8-12,15-19,22-26,29-33,36-40	q6W	グラニセトロン

登録疾患名	レジメン名	抗がん薬名	用法・用量	投与時間	スケジュール	1コースの周期	前処置等
膀胱癌	GCarbo療法	ゲムシタビン カルボプラチン	800mg/m2 AUC 4		d1,8,15 d2	q4W	
膀胱癌	GC療法(GEM+CDDP)	ゲムシタビン シスプラチン	1000mg/m2 70mg/m2		d1,8,15 d2	q4W	
膀胱癌	EP 単剤膀胱内注入療法	エピルビシン	30mg/body		d1	q1W	
膀胱癌	BCG膀胱内注入療法	イムノブラダー	40mg/body		d1	q1W	
膀胱癌	BCG膀胱内注入療法(80mg)	イムノブラダー	80mg/body		d1	q1W	
精巣腫瘍	BEP療法	プレオ ペブシド シスプラチン	30mg/body 100mg/m2 20mg/m2	1hr 3hr 2hr	d1,8,15 d1-5 d1-5	q3W	グラニセトロン デキサート アプレビタント
精巣腫瘍	CBDCA単剤療法	カルボプラチン	AUC7	1hr	d1	q3W	パロノセトロン デキサート アプレビタント デカドロン錠
腎細胞癌	キイトルーダ（腎細胞癌術後）	キイトルーダ	200mg/body	30min	d1	q3W	カロナル錠 ボラミン錠
腎細胞癌	キイトルーダ（腎細胞癌術後 6週間隔）	キイトルーダ	400mg/body	30min	d1	q6W	カロナル錠 ボラミン錠
腎細胞癌	オブジーボ療法	オブジーボ	240mg/body	30min	d1	q2W	カロナル錠 ボラミン錠
腎細胞癌	オブジーボ療法(4週間隔)	オブジーボ	480mg/body	30min	d1	q4W	カロナル錠 ボラミン錠
腎細胞癌	キイトルーダ+インライタ療法	キイトルーダ インライタ	200mg/body 10mg/day	30min p.o. b.i.d	d1 d-21	q3W	カロナル錠 ボラミン錠
腎細胞癌	レンパチニブ+キイトルーダ療法	キイトルーダ レンピマ	200mg/body 20mg/day	30min p.o. s.i.d	d1-21 d1	q3W	カロナル錠 ボラミン錠
腎細胞癌	アベルマブ+アキシチニブ療法	バベンチオ インライタ	10mg/kg 10mg/day	1hr p.o. b.i.d	d1 d1-14	q2W	カロナル錠 ボラミン錠
腎細胞癌	オブジーボ+カボザンチニブ療法	オブジーボ カボメテックス	240mg/body 40mg/day	30min p.o. s.i.d	d1 d1-14	q2W	カロナル錠 ボラミン錠
前立腺癌	ゾラデックス療法	ゾラデックスLA	10.8mg/body	s.c.	d1	q12W	
前立腺癌	リュープロレリン療法	リュープロレリン	3.75mg/body	s.c.	d1	q4W	
前立腺癌	リュープリンSR	リュープリン	11.25mg/body	s.c.	d1	q12W	
前立腺癌	リュープリンPRO	リュープリン	22.5mg/body	s.c.	d1	q24W	
前立腺癌	ゴナックス（初回）	ゴナックス	240mg/body	s.c.	d1	q4W	
前立腺癌	ゴナックス（維持）	ゴナックス	80mg/body	s.c.	d1	q4W	
前立腺癌	ドセタキセル療法	ドセタキセル	75mg/m2	2hr	d1	q3W	グラニセトロン デキサート ゾレドロン酸/ランマーク皮下注
前立腺癌	CBDCA+ETP療法	カルボプラチン ペブシド	AUC5 80mg/m2	2hr 2hr	d1 d1-3	q4W	パロノセトロン デキサート アプレビタント
前立腺癌	カバジタキセル療法	ジェブタナ プレドニゾン錠	25mg/m2 10mg/body	1hr p.o. s.i.d	d1 d1-21	q3W	デキサート ファモチジン ボラミン注

尿路上皮癌	キイトルーダ療法	キイトルーダ	200mg/body	30min	d1	q3W	カロナール錠 ボララミン錠
尿路上皮癌	キイトルーダ療法(6週間隔)	キイトルーダ	400mg/body	30min	d1	q6W	カロナール錠 ボララミン錠
尿路上皮癌	パベンチオ療法	パベンチオ	10mg/kg		d1	q2W	
尿路上皮癌	バドセブ療法	バドセブ	1.25mg/kg	30min	d1,8,15	q4W	デキサート
尿路上皮癌	オブジーボ療法	オブジーボ	240mg/body		d1	q2W	カロナール錠 ボララミン錠
尿路上皮癌	オブジーボ療法(4週間隔)	オブジーボ	480mg/body		d1	q4W	カロナール錠 ボララミン錠
尿路上皮癌	WeeklyTC療法	バクリタキセル カルボプラチン	70mg/m2 AUC 2	1hr 1hr	d1 d1	q1W	パロノセトロン デキサート ファモチジン ボララミン注 アプレピタント デカドロン錠
尿路上皮癌	バドセブ+キイトルーダ療法	バドセブ キイトルーダ	1.25mg/kg 200mg/body	30min 30min	d1,8 d1	q4W	カロナール錠 ボララミン錠 デキサート
尿路上皮癌	オブジーボ+GC療法	オブジーボ ゲムシタピン シスプラチン	360mg/body 1000mg/m2 70mg/m2	30min 30min 2hr	d1 d1 d2	q3W	カロナール錠 ボララミン錠 パロノセトロン デキサート アプレピタント デカドロン錠
尿路上皮癌	オブジーボ療法(術後 2週間隔)	オブジーボ	240mg/body	30min	d1	q2W	カロナール錠 ボララミン錠
尿路上皮癌	オブジーボ療法(術後 4週間隔)	オブジーボ	480mg/body	30min	d1	q4W	カロナール錠 ボララミン錠
TMB-High	キイトルーダ療法	キイトルーダ	200mg/body	30min	d1	q3W	カロナール錠 ボララミン錠

今村総合病院レジメナー覧

診療科	登録疾患名	レジメン名	抗がん薬名	用法・用量	スケジュール	1コースの周期
産婦人科	卵巣癌	BEP療法	ブレオ ペプシド シスプラチン	20mg/m2(max 30mg/body) 100mg/m2 20mg/m2	d2,9,16 d1-5 d1-5	q3W
産婦人科	卵巣癌	DC(ドセタキセル+カルボプラチン)療法	ドセタキセル カルボプラチン	70mg/m2 AUC5	d1 d1	q3W
産婦人科	卵巣癌	ddTC(パクリタキセル+カルボプラチン)療法	パクリタキセル カルボプラチン	80mg/m2 AUC6	d1,8,15 d1	q3W
産婦人科	卵巣癌	TC(パクリタキセル+カルボプラチン)療法	パクリタキセル カルボプラチン	180mg/m2 AUC5	d1 d1	q3W
産婦人科	卵巣癌	ベバシズマブ+DC療法	ベバシズマブ ドセタキセル カルボプラチン	15mg/kg 70mg/m2 AUC5	d1 d1 d1	q3W
産婦人科	卵巣癌	ベバシズマブ+TC療法	ベバシズマブ パクリタキセル カルボプラチン	15mg/kg 180mg/m2 AUC5	d1 d1 d1	q3W
産婦人科	卵巣癌	BEV+GEM+CBDCA療法	ベバシズマブ ゲムシタビン カルボプラチン	15mg/kg 1000mg/m2 AUC4	d1 d1,8 d1	q3W
産婦人科	卵巣癌	BEV+CPT-11+CDDP療法	ベバシズマブ カンプト シスプラチン	15mg/kg mg/m2	d1 d1 d1	q3W
産婦人科	卵巣癌	BEV+ドキシル+CBDCA療法	ベバシズマブ ドキシル カルボプラチン	15mg/kg 30mg/m2 AUC 3	d1 d1 d1	q4W
産婦人科	卵巣癌	GEM	ゲムシタビン	1000mg/m2	d1,8,15	q4W
産婦人科	子宮体癌	AP(ドキシソルビシン+シスプラチン)療法	ドキシソルビシン シスプラチン	60mg/m2 50mg/m2	d1 d1	q3W
産婦人科	子宮体癌	DC(ドセタキセル+カルボプラチン)療法	ドセタキセル カルボプラチン	70mg/m2 AUC5	d1 d1	q3W
産婦人科	子宮体癌	TC(パクリタキセル+カルボプラチン)療法	パクリタキセル カルボプラチン	180mg/m2 AUC5	d1 d1	q3W

今村総合病院レジメナー覧

産婦人科	子宮体癌	BEV+CPT-11+CDDP療法	ペバシズマブ カンプト シスプラチン	15mg/kg 60mg/m2 60mg/m2	d1 d1,8,15 d1	q4W
産婦人科	子宮体癌	wCDDP+RT療法	シスプラチン	40mg/m2(max 70mg/body)	d1	q1W
産婦人科	子宮頸癌	TC(パクリタキセル+カルボプラチン)療法	パクリタキセル カルボプラチン	180mg/m2 AUC5	d1 d1	q3W
産婦人科	子宮頸癌	ペバシズマブ	ペバシズマブ	15mg/kg	d1	q3W
産婦人科	子宮頸癌	ペバシズマブ+TC療法	ペバシズマブ パクリタキセル カルボプラチン	15mg/kg 180mg/m2 AUC5	d1 d1 d1	q3W
産婦人科	子宮頸癌	ペバシズマブ+DC療法	ペバシズマブ ドセタキセル カルボプラチン	15mg/kg 70mg/m2 AUC5	d1 d1 d1	q3W
産婦人科	子宮頸癌	BEV+CPT-11+CDDP療法	ペバシズマブ カンプト シスプラチン	15mg/kg 60mg/m2 60mg/m2	d1 d1,8,15 d1	q4W

今村総合病院レジメン一覧

診療科	登録疾患名	レジメン名	抗がん薬名	用法・用量	スケジュール	1コースの周期
総合内科	間質性肺炎	エンドキサンプルス	エンドキサン	500 mg/m ²	d1	q1W
総合内科	多発血管炎	リツキシマブ療法	リツキシマブ	375mg/m ²	d1	q1W
腎臓内科	結節性動脈周囲炎	エンドキサンプルス	エンドキサン	500mg/body	d1	q1W
消化器内科	胆道癌	Pembro+GC療法	キイトルーダ ゲムシタピン シスプラチン	200mg/body 1000mg/m ² 25mg/m ²	d1 d1,8 d1,8	q3W
消化器内科	食道癌	FP-rad療法	シスプラチン 5FU	70mg/m ² 700mg/m ²	d1 d1-4	q4W
消化器内科	膵癌	GEM	ゲムシタピン	1000mg/m ²	d1,8,15	q4W
消化器内科	膵癌	アブラキサン+GEM療法	アブラキサン ゲムシタピン	125mg/m ² 1000mg/m ²	d1,8,15 d1,8,15	q4W
消化器内科	膵癌	FOLFIRINOX	レボホリナート カンプト オキサリプラチン 5FU	200mg/m ² 180mg/m ² 85mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² cont46hr	d1 d1 d1 d1 d1-2	q2W
消化器内科	膵癌	mFOLFIRINOX	オキサリプラチン カンプト レボホリナート 5FU	85mg/m ² 150mg/m ² 200mg/m ² 2400mg/m ² cont46hr	d1 d1 d1 d1-2	q2W
消化器内科	膵癌	オニパド +5FU/LV	オニパド レボホリナート 5FU	70mg/m ² 200mg/m ² 2400mg/m ² cont46hr	d1 d1 d1-2	q2W
眼科	眼科	マイトマイシン	マイトマイシン	2mg/body	d1	-
皮膚科	頭部血管肉腫	weeklyパクリタキセル療法	パクリタキセル	100mg/m ²	d1,8,15,22,29,36	q7W
皮膚科	頭部血管肉腫	ドセタキセル療法	ドセタキセル	40mg/m ²	d1	q3W
皮膚科	メルケル細胞癌	バベンチオ	バベンチオ	10mg/kg	d1	q2W
皮膚科	悪性黒色腫	オブジーボ療法	オブジーボ	240mg/body	d1	q2W
皮膚科	全身性強皮症	リツキシマブ療法	リツキシマブ	375mg/m ²	d1	q1W

今村総合病院レジメン一覧

皮膚科	尋常性/落葉性天疱瘡	リツキシマブ療法	リツキシマブ	1000mg/body	d1	q2W
皮膚科	頭頸部癌	ドセタキセル+S1療法	ドセタキセル S1	40mg/m2 80mg/2	d1 d1-14	q3W
皮膚科	非ホジキンリンパ腫	レミトロ (PTCL・CTCL)	レミトロ	9μg/kg	d1-5	q3W
脳神経外科	悪性神経膠腫	アバスチン	ベバシズマブ	10mg/kg	d1	q2W
脳神経外科	悪性神経膠腫	アバスチン+テモダール療法 (維持・再発)	ベバシズマブ テモゾロミド	10mg/kg 150mg/m2 (基準を満たせば2 コース目より200mg/m2に増量 可能)	d1,15 d1-5	q4W
放射線科	肝動注	肝動脈塞栓療法	エピルピシン カルボプラチン アイエーコール ミリプラ シスプラチン 5FU	50mg/body 450mg/body 100mg/body 70mg/body 50mg/body 500mg/body 1000mg/body	d1 d1 d1 d1 d1 d1	q4W
歯科口腔外科	頭頸部癌	CDDP+RT療法	シスプラチン RT	100mg/m2 70Gy/35Fr	d1 d1-35	q3W q5W
歯科口腔外科	頭頸部癌	アービタックス+FP療法	アービタックス シスプラチン 5FU	400mg/m2(1コース目) 250mg/m2(2コース目以降) 100mg/m2 1000mg/m2	d1 d8,15 d1 d1-4	q3W